

ຂໍ້ແນະນຳໃນການ ຮັບມືກັບຄົນເຈັບ COVID-19




1. ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ຫລື ຫນ້າກາກອາໄມ ໂດຍສະເພາະເວລາພົບປະກັບບຸກຄົນອື່ນ ຢ່າງຫນ້ອຍຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດ
2. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ ແອວກໍຮໍ ຫລື ເຈວລ້າງມື ຢ່າງຫນ້ອຍ 20 ວິນາທີ່ຂຶ້ນໄປ ເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະເວລາຫລັງຈາກເຂົ້າຫ້ອງນໍ້າ
3. ບໍ່ໃຊ້ອຸປະກອນການກິນອາຫານ (ໄມ້ຕູ ຖ້ວຍ ບ່ວງ ຈານ) ຫລື ຈອກກິນນໍ້າ ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ
4. ດື່ມນໍ້າໃຫ້ພຽງພໍ ກິນອາຫານໃຫ້ຄົບຫ້າຫມູ່ ແລະຫລີກລ່ຽງການກິນອາຫານທີ່ປຸງ ແບບສຸກໆດີບໆ

1. ສວມນ້ຳກາກອນາມ້ຍຫລືນ້ຳກາກຜ້າ ໂດຍເຈາະເມື່ອຕ້ອງພົບປະ ຫລືອອຸ່ຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ອຸ່ຮ່ວກັບກັນໄມ້ນ້ອຍກວ່າ 1 ແມັຕຣ
2. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູແລະນ້ຳ ນານ 20 ວິນາທີ່ ຫລືແອລກອສອລ ເຈລລ້າງມື ເປັນປຣະຈຳ ໂດຍເຈາະຫລັງຈາກຄ່າຍປັສສາວະຫລືອອຸຈຈາຣະ
3. ໄມ້ໃຊ້ອຸປະກອນຮັບປຣະຫານອາຫານແລະແກ້ວນ້ຳຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ
4. ດື່ມນ້ຳສະອາດໃຫ້ເຟຶຍງພອ ຮັບປຣະຫານອາຫານໃຫ້ຄຣບຄ້ວນ ຕາມຫລັກໂຄຮນາກາຣ ຫລືກເລຶຍງກາຣຮັບປຣະຫານອາຫານທີ່ປຣຸງໄມ້ສຸກ



ຄຳແນະນຳໃນ ການປະກົບຕົຕົວ ສຳຮັບຜູ້ປ່ວຍ COVID - 19





ຂໍ້ແນະນຳໃນການ ຮັບມືກັບຄົນເຈັບ COVID-19



5. ຫລີກລ່ຽງການຢູ່ຮ່ວມກັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫລື ຜູ້ມີອາການທາງລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
6. ຮັກສາຄວາມສະອາດເຄື່ອງໃຊ້ສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ: ໂສ້ງ ເສື້ອ ຜ້າປູບ່ອນ ຜ້າເຊັດໂຕແລະອື່ນໆ ໂດຍການຊັກແພັບດ້ວຍນ້ຳທຳມະດາ ຫລື ຊັກດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນທີ່ມີອຸນຫະພູມ 60-90 ອົງສາ
7. ຫາກມີອາການໄຂ້ຂຶ້ນສູງ ໄອຫລາຍ ເມື່ອຍ ແຫນ້ນຫນ້າເອິກ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ເບື້ອອາຫານ ໃຫ້ຮີບຮ້ອນຕິດຕໍ່ ໂຮງຫມໍ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງເດີນທາງມາໂຮງຫມໍຄວນໃສ່ຜ້າອັດປາກ ໃນລະຫວ່າງທີ່ເດີນທາງ ບໍ່ຄວນໃຊ້ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຄວນໃຊ້ລົດສ່ວນຕົວໃນການເດີນທາງ
8. ຫລັງຈາກກັບຈາກໂຮງຫມໍ ຄວນກັກຕົວເອງຕໍ່ ເປັນເວລາ 7-14 ມື້

5. ໄມ່ຄຸກຄຸກກັບຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີອາການສ່ຽງໂຣດຕິດເຂົ້າລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ
6. ຫຳລັງສະອາດຂອງສ່ວນຕົວ ເຊັ່ນ ເສື້ອຜ້າ ຜ້າປູເຕີຍິງ ຜ້າຂນໝູ ຯລຯ ດ້ວຍພຽງຈັກຟອກຮຽມດາແລະນ້ຳ ຫລື ຈັກຜ້າດ້ວຍນ້ຳຮ້ອນທີ່ອຸນຫລັງມີ 60 – 90 ອົງສາ
7. ຫາກມີອາການໄຂ້ສູງ ໄອມາກ ເໝືອຍ ແໜ້ນຫນ້າອອກ ຫອບ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ເບື້ອອາຫານ ໃຫ້ຮີບຕິດຕໍ່ສູນພະຍາບາດ ຫາກຕ້ອງເດີນທາງມາສູນພະຍາບາດ ແນະນຳໃຫ້ສວມຫນ້າກາກ ຮ່ວງເດີນທາງ ໄມ່ໃຊ້ລະບົບຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ຄວນໃຊ້ຮາຍນັດສ່ວນຕົວ
8. ຫລັງກັບຈາກໂຮງພະຍາບາດ ກັກຕົວຕໍ່ 7-14 ວັນ




ຄຳແນະນຳໃນ ການປະຕິບັດຕົວ ສຳລັບຜູ້ປ່ວຍ COVID - 19





Hướng dẫn thực hiện dành cho bệnh nhân COVID-19



1. Luôn đeo khẩu trang y tế hoặc khẩu trang vải. Đặc biệt là khi gặp gỡ hay tiếp xúc với người khác, giữ khoảng cách ít nhất 1 mét.
2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc cồn rửa tay trong vòng 20 giây, đặc biệt sau khi đi vệ sinh xong.
3. Không dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác. Uống nước sạch hay nước đun sôi. Bổ sung đầy đủ dinh dưỡng.
4. Không nên ăn thức ăn còn sống.

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่อต้องพบปะหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ
3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
4. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก




คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID - 19





Hướng dẫn thực hiện dành cho bệnh nhân COVID-19



5. Không tập trung với nhóm bệnh nhân nghi ngờ nhiễm Covid-19.
6. Thường xuyên giặt giũ đồ dùng cá nhân như quần áo, khăn trải giường, khăn tắm, v.v... bằng bột giặt thông thường hoặc nước ấm từ 60-90 độ C.
7. Liên hệ với cơ sở y tế ngay lập tức... Bạn nên đeo khẩu trang khi đến nhà dưỡng lão. Không sử dụng phương tiện công cộng, chỉ nên sử dụng phương tiện cá nhân.
8. Sau khi trở về từ bệnh viện phải cách ly 7-14 ngày.

5. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
6. ทำความสะอาดของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 – 90 องศา
7. หากมีอาการไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว
8. หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน



คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID - 19





PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY



ကိစ္စ-၁ ငြုကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများအတွက် ပြုမူနေထိုင်သင့်သည့် အချက်အလက်များ



COVID19

1. ဆေးရုံသုံးမျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်း သို့မဟုတ် အဝတ်မျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်းကို တပ်ဆင်ထားပါ။ အထူးသဖြင့် အခြားသော လူအများနှင့်တွေ့ဆုံဆက်ဆံသည့်အချိန်တွင် ပိုသတိထားတပ်ဆင်ပါ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အနည်းဆုံး တစ်မီတာအကွာအဝေးခြားပါ။
2. လက်ကိုဆပ်ပြာအသုံးပြုပြီး ရေဖြင့်သေချာဆေးကြောခြင်း သို့မဟုတ် အယ်လ်ကိုဟောလက်ဆေးဂျယ်များဖြင့်ဆေးကြောခြင်းကို ပြုလုပ်ပေးပါ။ အထူးသဖြင့် ရေအိမ်ဝင်ပြီး အပေါ့၊ အလေးကိစ္စများပြီးစီးတိုင်း သေချာဆေးပါ။
3. အစားအသောက်အသုံးအဆောင်များနှင့် သောက်ရေခွက်များကို အခြားသူများနှင့်ရောနှောအသုံးမပြုရပါ။
4. သန့်ရှင်းသောရေကိုလုံလောက်အောင်သောက်ပါ။ အဟာရပြည့်ဝစေသော အစားအစာများကိုစားပေးပါ။ ကျက်အောင်ချက်ပြုတ်ထားခြင်းမရှိသော အစားအစာများကိုစားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะเมื่อต้องพบปะหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่น อยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร
2. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ นาน 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือเป็นประจำ โดยเฉพาะหลังจากถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระ
3. ไม่ใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและแก้วน้ำร่วมกับผู้อื่น
4. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ รับประทานอาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก



คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วย COVID - 19





PEOPLE TO PEOPLE CONNECTIVITY



ကိစ္စ-၁ ငှက်စက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူများအတွက် ပြုမူနေထိုင်သင့်သည့် အချက်အလက်များ



COVID19

5. အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်သောရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့် လူနာများနှင့် ရောနှောဆက်ဆံခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
6. မိမိ၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အဝတ်အစား၊ အိပ်ရာခင်း၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အစရှိသော ပစ္စည်းများကို ဆပ်ပြာမှုန့်နှင့် ရေအသုံးပြုပြီးသော်လည်းကောင်း အပူချိန် ၆၀ မှ ၉၀ ဒီဂရီအထိရှိသည့် ရေနွေးဖြင့်သော်လည်းကောင်း လေ့ကျင့်သုံးစွဲသင့်ပေးပါ။
7. အဖျားကြီးခြင်း၊ ချောင်းအလွန်ဆိုးခြင်း၊ မောခြင်း၊ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ အသက်ရှူရခက်ပြီးကြပ်ခြင်း၊ အစားအသောက်စိတ်မရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဆေးရုံသို့ချက်ခြင်းဆက်သွယ်ပါ။ ဆေးရုံသို့သွားရန်လုံအပ်လာပါက မဖြစ်မနေ မျက်နှာဖုံးနှာခေါင်းစည်းကို တပ်ဆင်လာပါ။ ခရီးလမ်းတွင် အများပြည်သူသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ယာဉ်များအသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သီးသန့်ဖြင့်သာ လာရောက်သင့်ပါသည်။
8. ဆေးရုံမှဆင်းပြီးသည့်အခါတွင်လည်း ဂူရုတ်မှ ဘုရားထပ်မံပြီး အခြားသူများနှင့်ခွဲခြားနေထိုင်ခြင်း (Quarantine)ကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ရပါမည်။

5. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
6. ทำความสะอาดของส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60 – 90 องศา
7. หากมีอาการไข้สูง ไอมาก เหนื่อย แน่นหน้าอก หอบ หายใจไม่สะดวก เบื่ออาหาร ให้รีบติดต่อสถานพยาบาล หากต้องเดินทางมาสถานพยาบาล แนะนำให้สวมหน้ากาก ระหว่างเดินทาง ไม่ใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ควรใช้รถยนต์ส่วนตัว
8. หลังกลับจากโรงพยาบาล กักตัวต่อ 7-14 วัน




คำแนะนำในการปฏิบัติตัว สำหรับผู้ป่วย COVID - 19





សេចក្តីណែនាំ សម្រាប់ការព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ ១៩



COVID19

1. ពាក់ម៉ាស់ឬម៉ាសក្រណាត់ ជាពិសេសនៅពេលជួបឬជាមួយអ្នកដទៃដោយនៅដាច់ឱ្យឆ្ងាយយ៉ាងតិច ១ ម៉ែត្រពីគ្នា។
2. លាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹករយៈពេល ២០ វិនាទីឬអស់កុល។ ដែលលាងដៃជាប្រចាំ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីនោមឬបន្ទោរបង់។
3. កុំចែករំលែកឧបករណ៍បរិភោគនិងកែវផឹកជាមួយអ្នកដទៃ។
4. ផឹកទឹកស្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ទទួលបានរបបអាហារពេញលេញយោងតាមអាហារូបត្ថម្ភ ចៀសវាងទទួលបានអាហារដែលមិនឆ្អិនទេ។

1. សวมអាកាសកាយម៉ាយអ្នកឬអាកាសកាយ ដោយឆ្ងាយពីគ្នាដោយមិនត្រូវប៉ះ ឬនៅជិតគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ មិនតិចជាង 1 ម៉ែត្រ
2. លាងដៃជាមួយសាប៊ូនិងទឹករយៈពេល 20 វិនាទី ឬអស់កុល ទៅលាងដៃ ជាប្រចាំ ដោយឆ្ងាយពីគ្នាដោយមិនត្រូវប៉ះ ឬនៅជិតគ្នាជាមួយអ្នកដទៃ
3. មិនត្រូវប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បរិភោគ និងកែវផឹកជាមួយអ្នកដទៃ
4. ផឹកទឹកស្អាតឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ ទទួលបានរបបអាហារពេញលេញយោងតាមអាហារូបត្ថម្ភ ចៀសវាងទទួលបានអាហារដែលមិនឆ្អិនទេ។




ការណែនាំ ការប្រតិបត្តិការ សម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID - 19





សេចក្តីណែនាំ សម្រាប់ការព្យាបាល អ្នកជំងឺកូវីដ ១៩



COVID19

5. កុំទាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញានៃការរលាកផ្លូវដង្ហើម។
6. សម្អាតរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា សំលៀកបំពាក់ កម្រាលពូក កន្លែងពោះគោ។ល។ ដោយមេរៀសាប៊ូបោកខោអាវនិងទឹក ឬលាងជាមួយទឹកក្តៅនៅសីតុណ្ហភាព ៦០-៩០
7. អង្សាសេ។
ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុនក្តៅខ្ពស់ ក្អកខ្លាំង ហត់នឿយ តឹងទ្រូង ពិបាកដកដង្ហើម បាត់បង់ចំណង់អាហារ សូមប្រញាប់ទាក់ទងមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវមកមន្ទីរពេទ្យ ត្រូវបានគេណែនាំឱ្យពាក់ម៉ាស នៅលើធ្វើដំណើរ កុំប្រើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ គួរប្រើរថយន្ត
8. ឯកជន
បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីមន្ទីរពេទ្យវិញ អ្នកចាំបាច់ត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល ៧-១៤ ថ្ងៃ។

5. មិនគួរក្តៅក្តាយជាមួយអ្នកជំងឺមានសញ្ញាសង្ស័យថាមានរោគសញ្ញានៃការរលាកផ្លូវដង្ហើម
6. ធ្វើការសម្អាតស្រទាប់ខ្លួន ដូចជា ខោអាវ កម្រាលពូក កន្លែងពោះគោ។ល។ ដោយមេរៀសាប៊ូបោកខោអាវនិងទឹក ឬលាងជាមួយទឹកក្តៅនៅសីតុណ្ហភាព ៦០-៩០
7. ប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុនក្តៅខ្ពស់ ក្អកខ្លាំង ហត់នឿយ តឹងទ្រូង ពិបាកដកដង្ហើម បាត់បង់ចំណង់អាហារ សូមប្រញាប់ទាក់ទងមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវមកមន្ទីរពេទ្យ ត្រូវបានគេណែនាំឱ្យពាក់ម៉ាស នៅលើធ្វើដំណើរ កុំប្រើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ គួរប្រើរថយន្ត
8. ឯកជន
បន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីមន្ទីរពេទ្យវិញ អ្នកចាំបាច់ត្រូវដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរយៈពេល ៧-១៤ ថ្ងៃ។



ការណែនាំ ការប្រតិបត្តិការ សម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID - 19

